

Kalmopyrin tablettá

Mielőtt elkezdené gyógyszerét alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót.

Ez a gyógyszer orvosi vény nélkül kapható. Az optimális hatás érdekében azonban elengedhetetlen a gyógyszer körültekintő és szakszerű alkalmazása.

- *Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.*
- *További kérdéseivel forduljon gyógyszerészéhez.*
- *Sürgősen keresse fel orvosát, ha tünetei 3-4 napon belül nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak.*

Milyen betegségek esetén használható és hogyan fejti ki hatását a Kalmopyrin tablettá?

Fájdalom és láz csillapítására, valamint reumás megbetegedések kezelésére szolgáló gyógyszer.

Milyen hatóanyagot és segédanyagokat tartalmaz a Kalmopyrin tablettá?

500 mg acetilszalícilsav tablettánként.

Segédanyagok: kalcium-glükonát, kukoricakeményítő, makrogol 6000, vízmentes kolloid szilícium-dioxid, talkum, burgonyakeményítő, magnézium-sztearát.

Mikor nem szabad Kalmopyrin tablettát szedni?

- Bármely komponens iránti túlérzékenység,
- vérképzőszervi megbetegedés,
- gyomor- és nyombélfekély,
- gyermekek bárányhimlő és influenza vírusfertőzése esetén,
- a terhesség utolsó 3 hónapjában.
- Gyermekeknek 12 éves kor alatt adása nem javallt.

Mit kell tudni a kezelés megkezdése előtt?

Ha a gyógyszer alkalmazásakor néhány napon, maximálisan 1 héten belül a tünetek nem enyhülnek, vagy láz, fejfájás, émelygés, hányás, fülzúgás, szédülés is jelentkezik, más terápiás kezelésre van szükség és orvoshoz kell fordulni.

A készítményt csak az orvos utasítására, a kezeléstől várható előny és/vagy kockázat gondos mérlegelése után szabad alkalmazni:

- gyomor- és nyombélfekély betegségben szenvedőknek;
- fokozott vérékenységű személyeknek;
- szalicilát tartalmú készítmények iránt érzékeny egyéneknek;
- asztma, szénanátha, orrpolip, krónikus légúti fertőzések (különösen szénanáthás tünetek) esetén;
- lázas megbetegedés esetén gyermekeknek;
- egyéb gyógyszerekkel szembeni túlérzékenység (csalánkiütés, viszketés, bőrreakció) esetén;
- állandóan fennálló vagy ismétlődő gyomor- és nyombélpanaszok esetén;
- máj- és vesebetegség esetén;
- szoptatás idején. Amennyiben a készítmény rendszeresen nagyobb mennyiségben történő alkalmazása válik szükségessé, a csecsemőt el kell választani.

Szedhető-e a készítmény terhesség és szoptatás idején?

Amennyiben Ön terhes vagy szoptat, tájékoztassa orvosát és kérje ki tanácsát a gyógyszer szedése előtt.

Szedhet-e egyéb gyógyszert a Kalmopyrin tablettával egyidőben?

A Kalmopyrin tablettá hatását más gyógyszerek befolyásolhatják, ezért a jelenleg, illetve közelmúltban szedett receptköteles vagy recept nélkül kiváltható gyógyszereiről tájékoztassa orvosát.

A kölcsönhatások az elmúlt időszakban, illetve a közeljövőben szedendő gyógyszerekre is vonatkozhatnak.

Alkohol fogyasztása nem kívánatos, a gyomorra kifejtett káros hatásokat fokozza.

Forduljon orvosához, ha a fenti pontok valamelyike érinti Önt, vagy bármikor a múltban érintette Önt.

Hogyan hat Kalmopyrin tablettát a gépjárművezetéshez, veszélyes gépek kezeléséhez szükséges képességekre?

Nem észleltek ilyen hatást.

Hogyan kell alkalmazni a Kalmopyrin tablettát?

Ha az orvos másképpen nem rendel,

Felnőttek szokásos napi adagja: 1-3-szor 1-2 tablettát (1-3-szor 500-1000 mg).

A maximális napi adag 4000 mg (8 tablettát);

12 éven felüli gyermekek szokásos napi adagja: 1-3 szor 1 tablettát (1-3 szor 500 mg).

A maximális napi adag 1500 mg (3 tablettát).

A tablettát ajánlatos bőséges folyadékkal, esetleg előzően összetörve bevenni.

A készítményt hosszabb időn keresztül orvosi ellenőrzés nélkül nem szabad alkalmazni.

Milyen tünetek jelentkeznek túladagolásakor?

A tartós, nagy adag szalicilát bevitel enyhe toxikus tüneteket okozhat. Kezdetben fülzúgás, hallás-csökkenés, fejfájás, zavartság, szapora légvétel észlelhető. Nagyobb adagok után (több gramm) légzészavar, a vér túlzott savassága, magas láz, kiszáradás, vérzékenységre való hajlam, tüdőödéma, görcsök, kóma alakulhat ki.

Mi a teendő a tablettát túladagolása esetén?

Ha az előírtnál több Kalmopyrin tablettát vett be, azonnal forduljon orvosához.

Ha adagját elfelejtette bevenni, a következő alkalommal ne vegyen be dupla adagot, mert ezzel már nem pótolja a kiesett mennyiséget, viszont a túladagolás veszélyének teszi ki magát.

Milyen nem kívánt hatásai lehetnek a Kalmopyrin tablettának és mi a teendő, ha ezek jelentkeznek?

Mint minden gyógyszernek, a Kalmopyrin tablettának is lehetnek mellékhatásai.

A gyógyszer alkalmazása során előfordulhat gyomor- és bélrendszeri panasz, asztmás roham, nagyobb adagoktól fülzúgás, szédülés.

Lázás megbetegedés esetén gyermekeknek csak orvosi utasításra célszerű alkalmazni. Amennyiben a gyógyszer alkalmazása során tartós hányás lép fel, haladéktalanul orvost kell hívni, mivel ez egy rendkívül ritka, de adott esetben életveszélyes betegség jele is lehet.

Bármely, a gyógyszer alkalmazása folyamán előforduló nemkívánatos mellékhatásról, valamint egyéb szokatlan tünetről vagy panaszról a kezelőorvost tájékoztatni kell, és a gyógyszer további szedése csak az orvos utasítására folytatható.

Fekete ún. szurokszéklet esetén vagy pedig tartós hányás jelentkezésekor azonnal orvoshoz kell fordulni!

Minden gyógyszerrel szemben kialakulhat túlérzékenységi reakció. Ezért felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben szokatlan tüneteket (pl. duzzadás, bőrkiütés, hirtelen vérnyomásesés stb.) észlel, a hagyja abba a gyógyszer szedését és feltétlenül forduljon kezelőorvosához.

Hogyan kell a Kalmopyrin tablettát tárolni?

Legfeljebb 25°C-on, az eredeti csomagolásban.

A gyógyszert csak a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni.

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!

A forgalombahozatali engedély jogosultja:

Richter Gedeon Rt., Budapest

Gyártó:

Richter Gedeon Rt., Budapest

Betegtájékoztató OGYI-eng. száma: 10 337/55/2003